


● 開封方法



- ①開封前に、切り口部分に溜まっているお薬を指で軽く押し下り、下の方へ移動させます。
- ②お薬が飛び散らないよう、なるべく上の方を持って、切り口から開封してください。

**ご不明な点は主治医または
看護師、薬剤師にご相談ください。**

医療機関名:

Eisai エーザイ株式会社

製品情報お問い合わせ先: エーザイ株式会社 hhcホットライン
フリーダイヤル 0120-151-454 9~18時(土、日、祝日 9~17時)

KTZ1001DKA
2017年12月作成

ケイツーシロップを使用される新生児のご家族の方へ

ケイツーシロップの 飲ませ方

ケイツーシロップは、赤ちゃんのビタミンK不足による出血を予防するお薬です。
1回1包を飲ませてください。



保存方法

- ・直射日光や高温を避けて保存してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。



監修: 杏林大学医学部小児科 楠田 聡

ご自宅での飲ませ方

＜スプーンで飲ませる場合＞

スプーンに原液シロップを少しずつ取り分けて、赤ちゃんの口に流し込んでください。

ほほの内側に垂らす様に流し込むとよいです。



＜哺乳びんの乳首で飲ませる場合＞

哺乳びんの乳首だけを赤ちゃんにくわえさせて、原液シロップを少しずつ流し込んでください。



＜哺乳びんで飲ませる場合＞

ミルクが湯冷まし、または母乳にシロップを混ぜて飲ませてください。

量は赤ちゃんが飲みきれの程度(10mL以下)に調整してください。

混ぜても良いもの

- ・湯冷まし
- ・母乳
- ・ミルク



10mL以下で
赤ちゃんが飲み
きれの量に調整
してください。



必ず哺乳びんやスプーンなどに移して飲ませてください。
スティックのまま飲ませると、
赤ちゃんのくちびるを傷つけたり、
まちがって気道に入ると
おそれがあります。

飲ませ方の注意

- ・使用直前に開封し、1回で使いきってください。
- ・他のお薬と混ぜないでください。
- ・目、鼻、耳に入らないように注意してください。

こんなときは・・・

- お薬を吐いたり、飲み残したとき
- お薬がこぼれてしまったとき

半分以下しか飲んでいないと思われるときは、
次回分を飲ませてください。
次回分をお持ちでない場合
や、追加の使用で足りなくなった分
に関しましては、主治医にご相談ください。

