

- ・私はワーファリンによる抗凝固薬療法を受けています。
- ・拮抗薬はビタミンKです。
- ・以下の薬剤は使用しないでください。
  - ①止血目的以外のビタミンK製剤（骨粗鬆症治療用のグラケーカプセル15mg）
  - ②抗リウマチ剤のイグラチモド（ケアラム錠25mg / コルベット錠25mg）
  - ③口腔・食道カンジダ症治療剤のミコナゾール・ゲル剤（フロリードゲル経口用2%）
  - ④深在性真菌症治療剤のミコナゾール注射剤（フロリードF注200mg）

## 患者さんへのお願い

あなたは抗凝固薬療法を受けておられます。

他の病医院や、他の診療科を受診されるときには、ワーファリンの治療を受けていることを医師、歯科医師、薬剤師の先生にお知らせください。

漏れなくお伝え頂くために、このカードを作成しました。

いつも持ち歩くようにしてください。

診察を受けられるときには、このカードを医師、歯科医師、薬剤師の先生方に必ずご提示ください。



製品情報お問い合わせ先

エーザイ株式会社 hhcホットライン

フリーダイヤル 0120-151-454 (9~18時 土、日、祝日9~17時)

抗凝固薬による最適な治療を受けていただくために、次のことにご注意ください。

- ・必ず指示されたとおりに服用してください。
- ・定期的に診察を受け、必ず血液凝固能検査を受けてください。
- ・手術を受けたり、歯を抜くときには、事前に主治医の先生にご相談ください。
- ・納豆や青汁・クロレラはワーファリンの血液を固まりにくくする作用を弱めますので食べないでください。
- ・他の病医院や、他の診療科でみてもらうときにはワーファリンの治療を受けていることを必ず医師、歯科医師、薬剤師の先生に知らせてください。

氏 名

---

住 所

---

☎

(                      )                      —

---

主治医

---

施設名

---

.....

---