

マクサルトRPD[®]錠10mgを 服用される方へ



マクサルトは、片頭痛による痛みを
和らげるおクスリです。
次のことを守って服用してください。



マクサルトRPD錠10mg

片頭痛の頭痛がおきたら

1錠 お飲みください。

(必ず、痛みが起きてからお飲みください。)



効果が不十分な場合のみ
もう1錠お飲みください。
ただし、最初の服用から

2時間以上
あけてください



服用は**1日2錠まで**です。

マクサルトRPD錠10mgの飲み方




- このお薬は口の中で速やかに溶け、水なしでも飲むことができます。
- 水なしで飲むときは唾液で飲み込んでください。
- 水で飲むときはふつうのお薬と同じように飲んでください。
- このお薬は壊れやすいので欠けたり割れたりすることがありますが、効き目にかわりはありません。欠けたり割れたりしたのものも一緒にお飲みください。

マクスルトを服用するときの注意

- このお薬を服用後に他の片頭痛薬であるエルゴタミン製剤（カフェルゴット、クリアミン等）やマクスルト錠と同様な作用を持つお薬を服用する場合、もしくはその逆の場合は24時間以上の間隔をあけて服用してください。
- 片頭痛やお薬の効果のため、眠くなることがあります。自動車の運転などは止めてください。
- このお薬を服用後、いつもと違う症状がでた場合は速やかに医師や薬剤師にご相談ください。



お薬の取り出し方




1

このお薬は、まず袋を破ってください。



2

乾いた手で中のシート裏面を矢印部分からはがしてください。
(剥がす前に押し出さないでください。)



3

爪をたてずに指の腹で中の錠剤を押し出してください。

※服用するまで袋から取り出さないでください。

その痛み 片頭痛による痛みですか？

片頭痛による痛みチェック



- 頭痛は、片側にあらわれている。
- 脈打つような痛みである。

- 頭痛時に吐き気がしたり、吐いてしまう。



- 強い光や、大きな音、不快な臭いなどで痛みが強まることもある。

- 体を動かすと痛みが強くなる。



いつもと痛みが違う場合は、片頭痛による頭痛ではないことも考えられます。

このような場合は医師にご相談ください。

追加情報

- いつもと違う薬を飲んだ場合
- 妊娠の可能性がある場合

このお薬を服用する前に医師にご相談ください。



エーザイ株式会社

東京都文京区小石川4-6-10

MAX0027BKA

2011年6月作成